

担い手農家・農業法人・集落営農組織むけ情報誌
お時間がある時にご覧いただきますようお願い申し上げます。

現在のJA提出書類・数量変更期限について

提出書類名	期限
米穀出荷契約数量変更	5月29日
大豆資材購入申込書	5月22日

農地中間管理機構の申請について

5月7日より中間管理機構の貸付申請受付が始まります。農地の借入を希望される方は市窓口、またはJA営農経済センター窓口へ申請書等を提出してください。



農地を貸したい方



農地を借りたい方



お申し込みください!

【受付期間】
1回目 5月7日(木)～6月30日(火)
2回目 9月25日(金)～11月10日(火)
【貸付申出書の有効期限】令和3年3月末日

ご応募ください!

【受付期間】**通年(随時)**
【借受希望申込書の有効期限】受付した2年後の年度末
※令和2年4月1日～令和3年3月31日受付分は、令和5年3月末日まで有効。
※申込書等を市町農政担当課またはJA担当部署窓口へ提出してください。また、機構の窓口でも受付できます。(メールでの提出可)
※申込内容を変更する場合は、変更申込書を提出してください。(用紙は申込書と同じです。)

申込書提出専用アドレス E-mail: nouchikoubou@gmail.com

令和2年度経営所得安定対策交付金・収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)申請手続きについて

●経営所得安定対策等交付申請書

農組長提出期限

5月18日

JA提出期限

5月25日

※住所・氏名等について前年(元年度)申請データに基づき印字されています。

変更がある場合は、訂正印を押印し、訂正下さい。

※2年度から初めて交付申請される方、また名義変更等による振込口座を変更される方は、交付申請書、口座変更届出書等の様式を切り取って使用してください。

裏面が【収入減少影響緩和交付金(ナラシ対策)】の積立て申出書となっております。

加入を希望される場合は、書き忘れの無い様ご注意願います。

※「米穀」、「小麦」、「六条大麦」、「大豆」の生産予定面積を記入下さい。

※米穀の対象は「主食用のみ」、ファイバースノウは「六条大麦」、大豆は黒大豆、種子大豆は対象外となります。

※生産予定面積の単位は「**m²単位**」ですので、桁数に注意して下さい。

<参考>

10a=1,000m²
1ha=10,000m²
10ha=100,000m²

除草剤の散布適期について

代かき:4/23・移植:**4/26**(早期)

移植後日数 (代かき後日数)	葉 齢									
	水稻	ノビエ	アゼナ	ホタルイ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ	ヒルム シロ	セリ	藻類	表層剥離
0 (3)	3.5	前	前	前	前	前	前	前	前	前
3 (6)	3.5	前	前	前	前	前	前	前	前	前
15 (18)	4.4	2.0	始	2.0	5cm	1	発生期	再生期	前	始
18 (21)	5.0	2.5	始	2.5	7cm	2.0	発生期	再生期	前	発生期
20 (23)	5.4	3.0	1	3.0	10cm	2.2	発生期	再生期	始	発生期
22 (25)	5.8	3.5	1	3.5	12cm	2.5	発生期	再生期	発生期	発生期
25 (28)	6.1	4.0	2	4.2	17cm	3.1	発生期	再生期	発生期	発生期

代かき:5/10・移植:**5/14**

移植後日数 (代かき後日数)	葉 齢						
	水稻	ノビエ	カヤツリ グサ	コナギ	ホタルイ	ミズガヤ ツリ	ウリカワ
0 (4)	2.1	前	前	前	前	前	前
3 (7)	2.3	0.2	前	前	始	前	前
7 (11)	2.6	2.0	前	0.5	1.5	1cm	始
10 (14)	3.4	2.5	前	0.8	2.2	3cm	1.0
12 (16)	4.2	3.0	前	1.5	2.7	5cm	1.6
15 (19)	4.9	3.5	1.6	2.1	3.2	8cm	2.3

代かきから
一週間まで
を目安に！



4月下旬移植圃場の雑草は水温がまだ低い為、雑草の動きが遅いなぁ。それに比べて5月中旬移植圃場の雑草は移植後1週間ですべての雑草が動き始めている！

移植時期によって除草剤を**散布するタイミングを変えた方が効果的**だな！



稲作情報

◆田植え後の水管理のポイント

- ①田植→活着期：苗が活着するまで(植付後3日程度)は、寒さや風からイネを守るため、必要に応じてや深水の湛水状態。
- ②分げつ期：活着したら、自然減水により水深3cm程度の浅水管理。
浅水管理を行うことにより、水温・地温を高く保つことになり、初期分げつを促します。
- ③中干し期：目標茎数確保(目標茎数の8割)で早めの中干しの実施。

◆還元障害に注意！

ほ場をこまめに観察し、還元障害(写真)を発見したら自然減水により、ほ場を軽く干してください。
(2、3日程度軽く干して、ガスを抜きをしましょう！)


中干し時期に十分な茎数がなかったり、生育がばらついて
いる場合でも、早めに中干しを開始します！



ヤミ田にご注意！

※4/22時点

令和2年産大麦葉色調査(SPAD)



4/22に生育調査を行ったところ、10月中旬播種圃場では実の肥大が確認でき、11月上旬播種圃場でも開花最盛期を終えていました。4月中旬の気温の低下により、前回(4/7)調査時よりも生育の進行が遅くなっていました。

成熟期は、10月中旬播種で5/25頃、11月上旬播種で6/1頃と予想されます。**収穫適期**(子実水分30%以下)は**成熟期から3日後が目安**となりますので適期に収穫できるよう早めに準備をお願いします。

また、5月上旬に大麦の生産記録をTAC担当、または営農指導員が配布しますので**収穫前にお近くの営農経済センター、もしくは各支店の営農経済係まで生産記録の提出をお願いします！**

注意：

気温が上がり雨が続くと赤かび病が発生しやすくなります！収穫前に圃場巡回をし、赤かび病の有無を確認しましょう！

※赤かび病被害



赤かび病かな？ちょっと圃場を見て欲しい！と思われましたら各地域のTAC担当、または各センターの営農指導員へご連絡下さい！

環境保全型農業直接支払交付金の取組の変更点について

取組11 緩効性肥料の利用および長期中干し に被覆肥料の被膜殻の流出防止策の実施が要件に追加されました！

交付単価：4,000円/10a以内

従来の緩効性肥料の施用と合わせて、14日以上の中干しを実施する取組(生育中期に1本/10a以上の溝切りを原則行う)

NEW！！ **被覆肥料の被膜殻の流出防止対策の実施**

多くの被覆(緩効性)肥料はプラスチック殻で肥料が覆われており、被膜殻が水面に浮いて、河川や琵琶湖に流れ出る可能性があります。プラスチック殻の流出を防止するために以下3点のチェックポイントを踏まえ作業してください。

《チェックポイント》

- ・あぜ塗り等による漏水防止対策
- ・浅水代かき等により田植え前の強制落水を行わない水管理
- ・本田を確認し、被膜殻の回収に努める



新型コロナウイルスの感染予防策について

緊急事態宣言発令中！！

新型コロナウイルス感染症の主な経過



※現在治療にあたっている医師の知見を元に作成しています。
症状や経過は個人により異なる場合があります。

<大津市以外にお住まいの方>

滋賀県健康医療福祉部相談センター

(草津保健所・甲賀保健所・東近江保健所・彦根保健所・長浜保健所・高島保健所)

・TEL:077-528-3637 (平日・土日祝日、8:30～17:15)

・FAX:077-528-4865

・E-mail:corona-soudan@pref.shiga.lg.jp