ii!! TAC 通信

令和4年.05.

担い手農家・農業法人・集落営農組織むけ情報誌
お時間がある時にご覧いただきますようお願い申し上げます。

JA北びわこ
営農振興課
TEL:　78－2415

臨時号

大麦の収穫開始について

施設名	浅井CE	虎姫RC※	びわCE	湖北西部RC	高月CE
品　種	ファイバースノウ	ファイバースノウ	ファイバースノウ	ファイバースノウ	ファイバースノウ
対象地域	浅井 虎姫・湖北	虎姫	びわ 虎姫・湖北	湖北	高月・伊香
連絡先	八島町1591 TEL　74-4020	月ヶ瀬町1368 TEL　73-3083	難波町644 TEL　72-4324	山本2296 TEL　79-0164	東柳野1259 TEL　85-5290
荷受期間	5月28日（土）～6月17日（金）				
荷受時間	午前10時　～　午後6時				

※各施設の対象地域において、お近くの施設へ搬入してください。
※虎姫RCに搬入された大麦はJAにて浅井CE・びわCEへ輸送します。専用のフレコンバッグを虎姫RCに準備していますのでご利用ください。虎姫RCは中継基地のため、荷受終了時間を午後5時までといたしますのでご注意ください。

大麦収穫適期

湖北農業普及指導センターより

播種時期	収穫可能水分（25%） 予想時期
10月中旬	5月29日頃
11月上旬	6月3日頃

大麦の荷受けにあたって注意事項

・生麦での施設搬入は、品質保持とコストの両面から子実水分14.0%～17.9%での搬入にご協力ください。
・「赤かび病被害粒」・「ソバ・雑草の混入麦」・「異臭麦」については、 施設荷受けをお断りいたします。
・本乾して搬入される場合は、過乾燥を防止するために、水分11.6～12.5%を目安に仕上げて下さい。
・本乾麦の荷受日は搬入される施設にお問い合わせ下さい。

麦施設利用料金（乾麦50kg当たり）

荷受水分	利用料（税抜）
11.5%以下	¥500
11.6～12.5%	¥584
12.6～13.9%	¥834
14.0～17.9%	¥1,217
18.0～19.9%	¥1,300
20.0～21.9%	¥1,384
22.0～23.9%	¥1,467
24.0～25.9%	¥1,550
26.0～27.9%	¥1,634
28.0～29.9%	¥1,717
30.0%以上	¥2,250

大麦収穫時のご注意！

① 収穫作業時は、長袖、防塵マスク、防塵メガネを着用して下さい。

大麦は芒（ぼう）が多く、収穫作業時に細かく粉砕されたヒゲやホコリ等は、目や口に入ったり皮膚に触れると強い不快感（はしかい、目の充血等）があります。**作業時の服装については十分ご留意ください。 また。風向き等も考慮し、近隣住民への配慮もお願いします。**

②適期収穫を心掛けて下さい！

高水分で大麦を収穫した場合、**大麦の芒（ぼう）が取りきれず、コンバインや乾燥施設内で詰まり、機械の故障の原因となります。**また、**大麦は刈り遅れると穂発芽しやすく、タンパクが低下しやすくなります。**ほ場の大麦を観察し、適期収穫を心掛けて下さい。また、**成熟期以降に2、3度降雨に合う**と**「芽くされ粒」**が多発し、**品質低下**や**採取した自家種の発芽不良の原因**になりますのでご注意ください。**大麦の状態(赤かび病発生・発芽しているなど)によって荷受をお断りする場合がございますのでご注意ください**。大麦の収穫適期は非常に短いので**優先して大麦収穫作業をされますようお願いします！**

刈り遅れ圃場

発芽してしまった大麦

収穫適期を逃すとこんな状態になってしまうのか…。**田植を中断してでも大麦収穫を優先**する必要があるな。

③刈獲り高さや脱穀の状態を確認しながら作業下さい。

大麦はワラが長く多いため、高速作業や深こぎによりコンバインに負荷がかかりやすくなります。負荷のかかった状態で作業すると、大麦の芒（ぼう）が取れずに機械に詰まる原因となります。**水稲収穫時よりも高刈りをするとともに刈取りのスピードを遅めにして、脱穀部の扱ぎ深さ（写真左下）を確かめながら作業して下さい。**また、グレンタンク内やスタンドバック等に排出された大麦の状態を確認しながら作業し、**排じんロスが多い場合は選別板調製ダイヤルを[開]へ、選別が悪い場合は選別板調製ダイヤルを[閉]へ調整してください**。もし芒が取り切れていない場合は、農機具購入先へご相談ください。

扱ぎ深さ表示例

④大麦収穫後の麦わらの処理について

麦わらを鋤き込む場合

収穫時にコンバインで十分に裁断し、収穫後数日置いてから丁寧に鋤きこみましょう。

野焼きは原則禁止となっていますが、やむを得ず焼く場合は、 下記の点とチェックリストの内容にご留意下さい。

大麦は小麦に比べて残渣（麦わら等）が非常に多く、収穫後に火を付けた場合**50cm以上の大きな火柱の波となることがあります。**周辺作物に影響を及ぼしたり、周辺への延焼を起こす可能性もあります。**畦畔から5メートル以上内側に麦わらを寄せて、**圃場周辺に延焼させないよう、風向や風の強さに十分気を付けて下さい。

※収穫後、麦わらを寄せて**10日ほど置いていただき**、少し目減りしたところを焼くことにより火柱を低減できます。また、湿り気がある事で**半焼き状態にでき、それを鋤き込む事で焼け残った有機物を活用し土壌物理性の改善に役立てる事もできます。**

〇藁を焼くときは、近隣農家と共同で作業し、複数人で圃場から離れずに管理をしましょう。

〇煙で自動車やバイクの視界を妨げないように注意しましょう。

〇火傷など怪我をしないように十分な準備をしましょう。

大麦のわら焼き

大麦のわらを焼くとすごく燃え上がるから**集落で焼くタイミングを案内・周知**したり、**消防署へ届出**をしておいたほうがいいかもしれないな。

危険のチェック

- □延焼を防ぐ**緩衝帯**をつくっていますか？
- □事前に**消防署**に連絡をしていますか？
- □**風**は強くないですか？**風向き**を確認していますか？
- □**衣服**は燃えにくい素材ですか？
- □緊急時のために**携帯電話**を持ち歩いていますか？
- □絶えず**複数人**で周囲の状況を確認していますか？
- □バーナーに**燃料漏れ**などがありませんか？
- □**燃料タンク**など、引火しやすいものを携行していませんか？
- □万が一のときは**どこに逃げるか**常に考えていますか？
- □**火から離れて**他の作業をしていませんか？

この他にも農作業安全情報をＨＰに掲載！
農水省　農作業安全　検索

除草剤情報（中後期除草剤）

ノビエが残ったらクリンチャー、ホタルイ・オモダカ等の広葉雑草が残ったらバサグランがおすすめです！

注：プレミア米・スタンダード米を生産されている方につきましては、クリンチャー剤以外の中後期除草剤の使用は、生産基準から外れますのでご相談ください。

区分	薬剤名	使用時期	1年生雑草			多年性雑草
			ノビエ	ノビエ葉期	広葉	
中期剤	ハイカット1キロ粒剤（注）	移植後15日～収穫60日前	○	3．5葉期	○	○
後期剤	クリンチャー1キロ粒剤	移植後7日～収穫30日前	○	4．0葉期	×	×
	バサグラン粒剤	移植後15日～55日 但し、収穫60日前まで	×	―	○	○
	クリンチャーバスME液剤	移植後15日～収穫50日前	○	5．0葉期	○	○

クリンチャーの散布時は3～5cmの水深を保って下さい。散布後3～4日は湛水状態を保ち、7日間は落水やかけ流しはしないでください。

バサグランは湛水状態で散布すると効果が薄れるので、落水した状態で散布しましょう。

オススメ除草剤紹介

☆レブラス　1キロ粒剤　・　エアー粒剤（中期剤）

4葉期までのノビエ、草丈が10cm程度になったホタルイ、草丈30cmまでのオモダカ・クログワイに対して効果のある有効成分アルテアを増量したことで、根や塊茎（イモ）までしっかり枯らします。

湛水散布でエアー剤はドローンによる散布も可能！！

使用時期：移植後14日後からノビエ4葉期、但し収穫60日前まで

☆セカンドショットS　ジャンボMX（中期剤）

移植後14日以降に使用できる中期用ジャンボ剤。稲が大きくなってきていても、薬剤が広がりやすく通常のジャンボ剤と同じように使用できるため、雑草に気づいた時にすぐ散布できます。

3.5葉までのノビエや幅広い広葉雑草に対して効果があります。また、畦畔から侵入するイボクサやキシュウウスズメノヒエに対して、進入抑制効果もあります。

使用時期：移植後14日後からノビエ4葉期、但し収穫60日前まで