TAC 06. 05 通信

担い手農家・農業法人・集落営農組織むけ情報誌
お時間がある時にご覧いただきますようお願い申し上げます。

JA北びわこ
営農振興課
TEL 78-2415

Vol. 2

JA北びわこ営農情報の LINE 公式アカウント はじめました！

◇LINEアプリで左のQRコードを読み取る または、
◇[@977svkrw]で友だち検索

稲作状況

昼夜の寒暖差と強風の影響で、植え痛みが発生し生育が遅れている可能性があります！

田植え後に低温・強風等の予報が出ている場合は深水管理により苗を守りましょう！

植え痛みとなった場合、風のない日は水位を浅水として地温を上昇させ、発根・活着を促しましょう。
なお、強風の日は水位を下げることを控え、苗を保護しましょう。

◆田植え後の水管理のポイント

①田植→活着期 ： 苗が活着するまで（植付後３日程度）は、寒さや風からイネを守るため、必要に応じて**やや深水の湛水状態**。

②分げつ期 ： 活着したら、自然減水により**水深3cm程度の浅水管理**。
浅水管理を行うことにより、水温・地温を高く保つことになり、初期分げつを促します。

③中干し期 ： 目標茎数確保（目標茎数の8割）で早めの中干しの実施。

◆還元障害に注意！

ほ場をこまめに観察し、還元障害（右写真）を発見したら自然減水により、ほ場を軽く干してください。
（２、３日程度軽く干して、ガスを抜きをしましょう！）

◆藻の発生に注意しましょう



近年、移植後の天候により藻が発生し生育を妨げる事例が発生しています。

藻が生え始めたら、速やかに浅水管理や水の入れ替えをして、藻が増えることを防ぎましょう。

◆中干しの時期です

現在の生育状況ですが、「コシヒカリ」や「みずかがみ」の早生品種の生育は、4月下旬から5月上旬の低温や強風により、植え痛みのほ場が一部に見られますが、おおむね順調です。今後の管理は浅水管理を基本とし、還元障害が出ているところでは軽い田干しが必要です。

茎数の増加に注意し、「中干し」が遅れないようにしましょう！

写真：中干しの程度（ひび割れと足跡）

中干し開始の茎数と時期の目安

【茎数】

栽植密度(株/坪)	1株あたり茎数
70	14～15本
60	17～18本
50	20～21本

【時期】

移植時期	中干しの目安時期
5月上旬	6月10日頃
5月中旬	移植後1カ月頃
5月下旬	移植後1カ月頃

除草剤情報（中後期除草剤）

初中期除草剤でとりこぼした雑草は、早いうちに対策をとりましょう。

注：プレミア米・スタンダード米を生産されている方につきましては、クリンチャー剤以外の中後期除草剤の使用は、生産基準から外れますのでご相談ください。

ノビエが残ったら・・・ **水を入れてクリンチャー**

イネとヒエの見分け方



区分	薬剤名	使用量/10a	使用時期	1年生雑草			多年性雑草
				ノビエ	ノビエ限界葉期	広葉	
中後期剤	クリンチャー1キロ粒剤	1kg	移植後7日～収穫30日前	○	4．0葉期	×	×
		1．5kg	移植後25日～収穫30日前		5．0葉期		
	クリンチャージャンボ	1kg	移植後7日～収穫30日前	○	4．0葉期	×	×
		1．5kg	移植後25日～収穫30日前		5．0葉期		
	クリンチャーEW	100ml	移植後20日～収穫30日前 250～1000倍に薄めて、茎葉散布。※展着剤が必要	○	6．0葉期	×	×

ホタルイ・オモダカ等の**広葉雑草が残ったら・・・** **水を落としてバサグラン**



区分	薬剤名	使用時期	1年生雑草			多年性雑草
			ノビエ	ノビエ葉期	広葉	
中後期剤	バサグラン粒剤	移植後15日～55日 但し、収穫60日前まで	×	―	○	○
	クリンチャーバスME液剤	移植後15日～収穫50日前	○	5．0葉期	○	○
	レブラス1キロ粒剤・ジャンボ剤・エアー粒剤	移植後14日～収穫60日前まで　※移植水稲	○	4．0葉期	○	○
	セカンドショットSジャンボMX	移植後14日～収穫45日前まで	○	3．5葉期	○	○

バサグランは湛水状態で散布すると効果が薄れるので、**落水した状態**で散布しましょう。

オススメ除草剤紹介

☆レブラス　1キロ粒剤　・　ジャンボ剤・エアー粒剤（中期剤）

4葉期までのノビエ、草丈が10cm程度になったホタルイ、草丈30cmまでのオモダカ・クログワイに対して効果のある有効成分アルテアを増量したことで、根や塊茎（イモ）までしっかり枯らします。

湛水散布でエアー剤はドローンによる散布も可能！！

また、散布後、完全に枯れなかった雑草に対しても、種子の生成を抑えることで抑年以降の雑草発生を抑えます。

レブラス1キロ粒剤：4，010円　　レブラスジャンボ：4,640円

☆セカンドショットS　ジャンボMX（中期剤）

移植後14日以降に使用できる中期用ジャンボ剤。稲が大きくなってきても、薬剤が広がりやすく通常のジャンボ剤と同じように使用できるため、雑草に気づいた時にすぐ散布できます。

3.5葉までのノビエや幅広い広葉雑草に対して効果があります。また、**畦畔から侵入するイボクサ**や**キシュウウスズメノヒエ**に対して、進入抑制効果もあります。

セカンドショットSジャンボMX：3，620円

キシュウスズメヒノエ

イボクサ

大麦情報

収穫の準備を始めつつ、今一度、圃場巡回をお願いします！

赤かび注意報発令中！！！

令和6年4月23日付で滋賀県病害虫防除所より送付された「令和6年度　病害虫発生予察注意報第2号」により麦類の赤かび病注意報が発表されております。

※赤かび病被害

ちょっと圃場を見て欲しい！と思われましたら各地域のTAC担当へご連絡下さい！

現在、JAに出荷契約がある方に大麦の生産記録を配布しています！まだ提出されていない方は速やかに各地域の営農係又はTAC担当へご提出ください！

大豆･大麦資材紹介

粒状苦土石灰による収量向上に向けた土づくり

特徴

1．酸性土壌を適正pHに矯正（中和）
2．カルシウムとマグネシウムを補給
3．有機物の分解を促進し、微生物の働きを活発化

土壌が酸性に傾くと、
生育阻害や病害発生が助長され収量・品質に影響が及びます。

☆そこで
粒状苦土石灰の施用により、適正土壌pHに矯正しましょう。

大豆の適正土壌pHは6.0～6.5　目標値：6.5
大麦の適正土壌pHは6.2～7.0　目標値：6.5

令和3年度 JA北びわこ土壌分析結果

予定作物	pH	
	平均	土壌点数
水稲	5.8	148
麦･大豆	5.5	153
園芸作物	5.7	28
果樹	7.0	55
総計	5.8	384

広域土壌分析センター滋賀の分析結果より

粒状苦土石灰散布の効果

- 石灰の補給により、根を強く伸長し肥料の吸収を高めます。
- 葉緑素の生成に必要な苦土を補給することで、光合成を促進します。
- 有機物の分解を促進し、微生物の働きを活発化することで良質な土をつくります。

適正土壌pHに矯正することで収量向上に繋がります！！

粒状苦土石灰

苦土石灰は効果がゆっくり現れる緩効性です。
施肥量：100kg/10aあたり

保証成分

アルカリ(%)	苦土(%)
55	15(可溶性苦土)

土壌分析

大麦収穫後圃場で土壌分析してみてはどうですか？

大麦収穫後の土壌で土壌分析をしてみませんか。麦後作物や翌年産水稲の施肥設計をするために、今の土壌状況を確認することが重要です。

土壌分析基本項目
水　田：pH、EC、りん酸、石灰、苦土、加里、けい酸
その他：pH、EC、りん酸、石灰、苦土、加里、硝酸態窒素

土壌分析　随時募集中！！
各地域のTAC担当までお気軽にお申し付けください！！

農業経営管理支援事業（記帳代行）について

農家組合員の皆様の悩みの一つになっている「会計記帳」の解消に向けた取組としまして「記帳代行サービス」を現在行っております。

☆記帳代行サービスとは？

農家組合員の皆様に代わって、農業にかかる日々の会計記帳をJAグループが代行することで、厄介な経理事務負担が大幅に軽減されるサービスです。

記帳代行サービスで出来ること

①煩わしい農業にかかる日々の会計記帳をJAグループが代行します！
②比較分析・期間分析で経営の客観視が可能！

経営分析・経営診断で現状を確認する事で、その人に合った取組・事業の提案を受けることができます！

利用者は３カ月に１回程度面談するだけ！

日々の農業に関する取引について、JAと支援機関にて仕分けを行い、年に数回面談をしていただく事で右記見本のような決算書の作成ができます！

ご利用者の皆さまからは、「申告時の手続きが楽になった」と好評です！



令和6年度新規利用者募集しています！

詳しくは各TAC担当・営農指導員までお気軽にご連絡下さい。

自動車共済【季節農業用自動車保障特約】について

季節農業用自動車の事故に対する保障はされていますか？

農機具の使用前に今一度保険の見直しを！

田植機
（稲の苗の植付に使用）

刈取脱穀作業車
（主に稲作に使用）

台数関係なく一括保障
特約共済掛金（一時払）
3，880円

JAの自動車共済にご加入されている車に対し、特約を付けることで季節農業用自動車(田植機、コンバイン、ブームスプレーヤーなど)の保障を受けることができます！
※トラクターは特約の対象外です。
詳しくは各TAC担当へお問い合わせください！

JA健診のご案内

JA健康寿命100歳プロジェクト！

JAでは、「組合員の健康と暮らしを支える活動」として巡回健診を行っています。お近くのJAにお越しいただくだけで、病院と同様の人間ドックが受診できます！この機会にぜひご利用ください！

健診日程

令和6年11月21日（木）・11月22日（金）・11月25日（月）（3日間）
締切日　令和6年10月4日（金）

開催場所

JA北びわこ　本店別館（3日間）

申込書は5月中旬に発送された令和6年産米穀の出荷契約書確定通知に同封され、JA出荷農家様のもとへ郵送されます。
また、JA各支店・営農経済センター窓口に用意してあります！
また、JA北びわこホームページからもダウンロードできます！
https://www.jakitabiwako.jp/news_topics/topics-2837/

お問合せ・お申込みは

長浜市湖北町速水2721番地
JA北びわこ 本店　くらしの活動課
☎　78-8777　　FAX　78-2522

お得な情報！

長浜市の助成をご存知ですか？

★ 国保　40歳～75歳未満　人間ドック助成（年度中1回まで）
＊年齢基準は健診当日の年齢です。

長浜市の国民健康保険被保険者の方は、健診料金の一部が助成されます。
国保税（料）を完納されている40歳以上75歳未満の方（健診受診日当日の年齢）は、必ず受診前に市窓口に申請してください。手続きについては長浜市　保険年金課（65－6512）にお問い合わせください。

助成内容　：　レディースドック、メンズドック、JAドック、オプション健診費用の2分の1（上限2万）が補助されます。

※助成の申請の枠に限りがありますので、お早めに申請ください！

注意！　オプション健診のみでの受診は、対象となりません。

農作業中の熱中症を予防しましょう!!

農業者のみなさまへ

夏に向けて、農作業中に熱中症になる人が増えてきます。
熱中症は正しい知識を身につけることで、適切に予防することが可能です!!

農作業中の熱中症

- 毎年、約30名の方が農作業中の熱中症により死亡
- 死亡事故の約85%が7～8月に発生している一方で3～6月にも発生



予防のポイント

暑さを避ける

高温時の作業は極力避け、日陰や風通しのよい場所で作業

こまめな休憩と水分補給

喉の渇きを感じる前に、こまめに水分・塩分を補給

単独作業は避ける

複数名で作業を行う、時間を決めて連絡をとり合う

熱中症対策アイテムの活用

帽子や吸湿速乾性の衣服の着用、空調服や送風機の活用

そのほか、日々の体調管理など熱中症に負けない体づくりをしておきましょう！