

担い手農家・農業法人・集落営農組織むけ情報誌
お時間がある時にご覧いただきますようお願い申し上げます。

JA北びわこ営農情報の



LINE

はじめました！

公式アカウント



◇LINEアプリで左の
QRコードを読み取る
または、
◇[@977svkrw]
で友だち検索

稲作状況

昼夜の寒暖差と強風の影響で、植え痛みが発生し
生育が遅れている可能性があります！

田植え後に低温・強風等の予報が出ている場合は
深水管理により苗を守りましょう！

植え痛みとなった場合、風の無い日は水位を浅水として地温を上昇させ、
発根・活着を促しましょう。

なお、強風の日は水位を下げることを控え、苗を保護しましょう。



◆田植え後の水管理のポイント

①田植→活着期：苗が活着するまで(植付後3日程度)は、寒さや風からイネを守るため、必要に応じてやや深水の湛水状態。

②分けつ期：活着したら、自然減水により水深3cm程度の浅水管理。
浅水管理を行うことにより、水温・地温を高く保つことになり、初期分けつを促します。

③中干し期：目標茎数確保(目標茎数の8割)で早めの
中干しの実施。

◆還元障害に注意！

ほ場をこまめに観察し、還元障害(右写真)を発見したら
自然減水により、ほ場を軽く干してください。



(2、3日程度軽く干して、ガスを抜きをしましょう！)

◆藻の発生に注意しましょう

近年、移植後の天候により藻が発生し生育を妨げる事例が発生しています。

藻が生え始めたら、速やかに浅水管理や水の入れ替えをして、藻が増えることを防ぎましょう。



◆中干しの時期です

現在の生育状況ですが、「コシヒカリ」や「みずかがみ」の早生品種の生育は、4月下旬から5月上旬の低温や強風により、植え痛みのほ場が一部に見られます。今後の管理は浅水管理を基本とし、還元障害が出ているところでは軽い田干しが必要です。

茎数の増加に注意し、「中干し」が遅れないようにしましょう！

中干し開始の茎数と時期の目安

【茎数】		【時期】	
栽植密度 (株/坪)	1株あたり 茎数	移植時期	中干しの 目安時期
70	14～15本	5月上旬	6月10日頃
60	17～18本	5月中旬	移植後1カ月頃
50	20～21本	5月下旬	移植後1カ月頃



写真：中干しの程度（ひび割れと足跡）



除草剤情報（中後期除草剤）


初中期除草剤でとくにぼした雑草は、早いうちに対策をとみましょう。

注：フレミア米・スタンダード米を生産されている方につきましては、**クリンチャー剤以外の中後期除草剤の使用は、生産基準から外れますのでご相談ください。**

ノビエが残ったら・・・ **水を入れてクリンチャー**



イネとヒエの
見分け方



区分	薬剤名	使用量/10a	使用時期	1年生雑草			多年性雑草
				ノビエ	ノビエ 限界葉期	広葉	
中後期剤	クリンチャー 1キロ粒剤	1kg	移植後7日～収穫30日前	○	4. 0葉期	×	×
		1. 5kg	移植後25日～収穫30日前		5. 0葉期		
	クリンチャー ジャンボ	1kg	移植後7日～収穫30日前	○	4. 0葉期	×	×
		1. 5kg	移植後25日～収穫30日前		5. 0葉期		
	クリンチャー EW	100ml	移植後20日～収穫30日前 250～1000倍に薄めて、茎葉散布。※展着剤が必要	○	6. 0葉期	×	×

ホタルイ・オモダカ等の**広葉雑草が残ったら・・・**

水を落として**バサグラン**

ホタルイ



葉の先端が尖る



○ 葉を指でしごくとき 花蕾のシコリがある

コナギ



ハート型



上から見ると放射状に見える

クログワイ



・葉の先端が丸い
・先端に明瞭な白い点がある



○ 葉を指でしごくとき ぶちぶち音がする

オモダカ



矢尻型



クサネム



発生初期は
上から見ると一列に見える

区分	薬剤名	使用時期	1年生雑草			多年性 雑草	特徴
			ノビエ	ノビエ 葉期	広葉		
中後期剤	バサグラン粒剤	移植後15日～収穫45日前まで	×	—	○	○	一年生雑草から多年生雑草まで幅広い雑草に効果がある
	クリンチャーバスME液剤	移植後15日～収穫50日前	○	5.0葉期	○	○	茎葉散布で、発芽後から5葉期までのノビエを枯殺する
	レプラス1キロ粒剤・ジャンボ剤・エアー粒剤	移植後14日～収穫60日前まで ※移植水稻	○	4.0葉期	○	○	アルテア配合により多年性雑草に強く、地上部だけでなく塊茎も減らすことが可能
	セカンドショットSジャンボMX	移植後14日～収穫45日前まで	○	3.5葉期	○	○	一発除草剤の効果が切れた頃に畦畔から侵入するイボクサなどに効果あり、上手に使いえば畦畔からの侵入を抑制可能
	アレイルSC	移植後20日～収穫45日前まで	○	5.0葉期	○	○	茎葉だけでなく、田面や水面に落ちた成分も根から吸収するので、天気を気にせず、散布可能
	ロイアント乳剤	移植後20日～収穫45日前まで	○	5.0葉期	○	○	散布適期の幅が広く、生育の進んだ雑草を取りこぼさない

バサグランは湛水状態で散布すると効果が薄れるので、**落水した状態**で散布しましょう。

オススメ除草剤紹介

☆レブラス 1キロ粒剤 ・ ジャンボ剤・エアー粒剤(中期剤)

4葉期までのノビエ、草丈が10cm程度になったホタルイ、草丈30cmまでのオモダカ・クログワイに対して効果のある有効成分アルテアを増量したことで、根や塊茎(イモ)までしっかり枯らしめます。

湛水散布でエアー剤はドローンによる散布も可能！！

また、散布後、完全に枯れなかった雑草に対しても、種子の生成を抑えることで抑年以降の雑草発生を抑えます。

レブラス1キロ粒剤:4,170円 レブラスジャンボ:4,560円



☆セカンドショットS ジャンボMX(中期剤)

移植後14日以降に使用できる中期用ジャンボ剤。稲が大きくなってきても、薬剤が広がりやすく通常のジャンボ剤と同じように使用できるため、雑草に気づいた時にすぐ散布できます。

3.5葉までのノビエや幅広い広葉雑草に対して効果があります。また、畦畔から侵入するイボクサやキシウスズメノヒエに対して、進入抑制効果もあります。

セカンドショットSジャンボMX:3,790円



キシウスズメノヒエ



イボクサ



☆アレイルSC(中期剤)

移植後20日以降に使用できる液剤。5葉期までのノビエ、ホタルイ、クサネム、ヒレタゴボウ等主要な雑草に効果があります！

茎葉だけでなく、田面や水面に落ちた成分も根から吸収するので、
天気を気にせず、散布が可能！また、湛水での散布も可能な除草剤です！

アレイルSC(500ml):4,080円



ヒレタゴボウの種



ヒレタゴボウ



☆ロイヤント乳剤(中期剤)

移植後20日以降に使用できる液剤。5葉期までのノビエ、一年生雑草、多年生雑草のほか、クサネム、イボクサにも素早い効果があります！5葉期のノビエと大きな広葉雑草に優れた効果があり、散布適期の幅が広く、生育の進んだ雑草を取りこぼしません！

散布2時間後の雨でも効果を発揮し、もしもの雨でも再散布の必要がありません。

ロイヤント乳剤(200ml):3,700円



大麦情報

大麦の収穫時期は5月下旬～6月上旬頃と予想されます。
収穫適期が短いため、刈り遅れに注意して収穫を行いましょう！

赤かび注意報発令中！！！！

令和7年4月21日付で滋賀県病虫害防除所より送付された「令和7年度 病虫害発生予察注意報第1号」により麦類の赤かび病注意報が発表されております。

※赤かび病被害



ちょっと圃場を見て欲しい！と思われましたら各地域のTAC担当へご連絡下さい！

現在、JAに出荷契約がある方に大麦の生産記録を配布しています！まだ提出されていない方は5月16日(金)までに各地域の営農経済センター又は各地域TAC担当へご提出ください！

大豆・大麦資材紹介

粒状苦土石灰による収量向上に向けた土づくり

特徴

1. 酸性土壌を適正pHに矯正(中和)
2. カルシウムとマグネシウムを補給
3. 有機物の分解を促進し、微生物の働きを活発化



土壌が酸性に傾くと、
生育阻害や病害発生が助長され収量・品質に影響が及びます。

☆そこで
粒状苦土石灰の施用により、適正土壌pHに矯正しましょう。

大豆の適正土壌pHは6.0～6.5 目標値：6.5
大麦の適正土壌pHは6.2～7.0 目標値：6.5

令和3年度 JA北びわこ土壌分析結果

予定作物	pH	
	平均	土壌点数
水稲	5.8	148
麦・大豆	5.5	153
園芸作物	5.7	28
果樹	7.0	55
総計	5.8	384

広域土壌分析センター滋賀の分析結果より

粒状苦土石灰散布の効果

- ・石灰の補給により、根を強く伸長し肥料の吸収を高めます。
- ・葉緑素の生成に必要な苦土を補給することで、光合成を促進します。
- ・有機物の分解を促進し、微生物の働きを活発化することで良質な土をつくれます。



適正土壌pHに矯正することで収量向上に繋がります！！

粒状苦土石灰

苦土石灰は効果がゆっくり現れる
緩効性です。
施肥量：100kg/10aあたり

保証成分

アルカリ(%)	苦土(%)
55	15(可溶性苦土)

土壌分析

大麦収穫後圃場で土壌分析してみてもいいですか？

大麦収穫後の土壌で土壌分析をしてみませんか。麦後作物や翌年産水稻の
施肥設計をするために、今の土壌状況を確認することが重要です。

土壌分析基本項目

水 田:pH、EC、りん酸、石灰、苦土、加里、けい酸
その他:pH、EC、りん酸、石灰、苦土、加里、硝酸態窒素

5点まで無料！



土壌分析 随時募集中！！

各地域のTAC担当までお気軽にお申し付けください！！


土壌診断をしてみませんか

土壌診断をすることで・・・

- ・今の土の状況がわかる(左図 黒実線)
- ・土づくり資材を施用したシミュレーション
ができる

(左図 赤点線が資材施用の土壌シミュレーション)

※大麦跡大豆の場合



自動車共済【季節農業用自動車保障特約】について

季節農業用自動車の事故に対する保障はされていますか？

所有・借用している保障対象の農業用自動車にかかる賠償責任と自損事故(傷害)を
包括的に保障します！

自動車共済(主契約)



トラクター



軽トラック



特約



田植機



刈取脱穀作業車



農業用薬剤散布車



移植機



収穫機



摘採機

台数関係なく一括保障
特約共済掛金(一時払)

3,880円

令和6年4月1日現在


※保障の対象となるのは、所定の植付機、収穫機、
農業用薬剤散布車に限ります。

スマート農業について

	ザルビオ	Z-GIS
利用料金	年額:13,200円～(税込)	月額:220円(税込)
特徴	①地力マップ・生育マップ ②天気予想・散布天気予想 ③生育ステージ予測 ④病害アラート ⑤可変施肥&可変散布マップ	①簡単な管理 ②データの視覚化:見える化 ③データの共有 ④高解像度地図
その他	プランによって使える機能 年額料金が変わる	登録2,000圃場以上は 月額定額4,400円(税込)



【地力マップ・生育マップ】



【Z-GISの地図】



←登録から操作方法
までJAがサポ
ートを行います！

興味のある方・始めてみたいと思っている方は、気軽に営農振興課(TEL.0749-78-2415)または各地域TACにお問い合わせください！

その他情報提供①

農業法人等新入社員研修会(第1回)の開催について

新入社員のスキルの修得による不安の解消から仕事への意欲的な姿勢の確立を目的としてこの研修会が開催されます！

※今回の研修会は、県内農業法人等に就職して概ね5年以内の従業員が対象となります

- 日時:令和7年6月27日(金)13:30～16:30(受付13:00～)
- 場所:滋賀県立農業大学校 2階 合同教室
(滋賀県近江八幡市安土町大中503)
- 定員:30名程度
- ※令和7年6月20日(金)までに申し込みください



興味のある方は、営農振興課(TEL.0749-78-2415)まで問い合わせください

その他情報提供②

JA健康寿命
100歳プロジェクト！

JA 健診のご案内



JAでは、「組合員の健康と暮らしを支える活動」として巡回健診を行っています。お近くのJAにお越しいただくだけで、病院と同様の人間ドックが受診できます！この機会にぜひご利用ください！

健診
日程
開催
場所

令和7年11月20日(木)・11月21日(金)・11月25日(火)(3日間)
締切日 令和7年10月3日(金)

JA北びわこ 本店別館(3日間)

申込書は5月9日に発送された令和7年産米穀の出荷契約書確定通知に同封され、JA出荷農家様のもとへ郵送されます。

また、JA各支店・営農経済センター窓口にて用意してあります！

また、JA北びわこホームページからもダウンロードできます！

お得な情報！

長浜市の助成をご存知ですか？

★ 国保 40歳～75歳未満 人間ドック助成(年度中1回まで)

*年齢基準は健診当日の年齢です。

お問合せ・お申込みは

長浜市湖北町速水2721番地

JA北びわこ 本店 ぐらしの活動課

☎ 78-8777 FAX 78-2522



長浜市の国民健康保険被保険者の方は、健診料金の一部が助成されます。

国保税(料)を完納されている40歳以上75歳未満の方(健診受診日当日の年齢)は、必ず受診前に市窓口にて申請してください。手続きについては長浜市 保険年金課(65-6512)にお問い合わせください。

助成内容：レディースドック、メンズドック、JAドック、オプション健診費用の2分の1(上限2万)が補助されます。

※助成の申請の枠に限りがありますので、お早めに申請ください！

注意！ オプション健診のみでの受診は、対象となりません。

その他情報提供③

令和7年度 農業振興課が所轄する補助事業について

令和7年度の補助事業について紹介いたします。

交付申請受付期間は令和7年6月2日(月)～6月30日(月)になりますので、長浜市役所農業振興課まで問い合わせください。

	事業名	助成機関
施設及び 機械整備	園芸振興・転換作物生産推進事業	市
	農業経営持続・効率化支援事業	市
	【新設】若者就農支援事業補助金	市
施設及び 機械整備	担い手確保・経営強化支援事業	国
	農地利用効率化等支援事業	国
生産性の向上	麦及び大豆の生産性及び品質向上補助金	市
人材育成	新規就農者育成総合対策経営開始資金	国
	新規就農者育成総合対策経営発展支援事業	国・県

※長浜市ホームページ「農業に関する補助金一覧」より一部抜粋

○予算の範囲内での補助となりますので、ご注意ください

○補助対象となる内容についてはホームページに書かれている他にもご注意ください
いただくことがありますので、詳細については長浜市役所農業振興課(TEL.0749-65-6522)まで問い合わせください

○事前に発注(契約)したものは対象外となります

あとは収穫を残すのみ！

今年はしっかりと大麦を採りましょう！

昨年、多くの大麦ほ場で収穫遅れによるほ場での収穫ロスが多く見受けられました。
適期に収穫を行うことで収穫ロスを大きく抑えられます！

●昨年の反省点(刈遅れ)

- ほ場での収穫ロスの多発生
- 穂発芽等品質の低下

適期収穫に
努めましょう！！

☆収穫遅れは収穫ロスの発生により麦数量払交付金の減額につながります。
☆大麦の収穫は梅雨の合間での作業になります。ほ場の子実水分をこまめに測り、早めの収穫作業の計画を立てましょう！

～適切な収穫のポイント～

- 大麦の収穫適期は子実水分25%以下！（成熟期から1～3日後）
- 収穫後は速やかに乾燥施設へ！
- 刈り遅れに注意！
- 倒伏や赤かび病の発生が多い場合は刈り分けをしましょう！

成熟期 前日数	立毛状況	子実水分	茎葉や子実の状況
10 日前頃		 水分40%後半	茎が下部から黄化 (黄化程度3割) 芒のほとんどは黄化しているが、子実は緑色
6 日前頃		 水分30%後半	茎の黄化程度5割 子実の背側は黄化している が腹側は緑色
成熟期		 水分30%前後	茎葉と子実のほとんどが黄化 子実が固く引き締まる 屈曲した穂の割合が50%程度 

※成熟期以降連続降雨が予想される場合は、緊急避難的にやや高水分(35%以下)でも収穫を開始してください。

栽培条件・降雨・倒伏・強制登熟等により、立毛の外観・穀粒等の状態が必ずしも一致しない場合がありますので、収穫判定にあたっては穀粒水分の低下を最優先して総合的に判断してください。


農作業中の熱中症を 予防しましょう!!

夏に向けて、農作業中に熱中症になる人が増えてきます。

熱中症は正しい知識を身につけることで、適切に予防することが可能です!!

* 農作業中の熱中症 *

- 毎年、約**30**名の方が農作業中の熱中症により**死亡**
- 死亡事故の約**85%**が**7～8月**に発生している一方で3～6月にも発生



* 予防のポイント *

暑さを避ける

高温時の作業は極力避け、日陰や風通しのよい場所で作業



こまめな休憩と水分補給

喉の渇きを感じる前に、こまめに水分・塩分を補給



単独作業は避ける

複数名で作業を行う、時間を決めて連絡をとり合う



熱中症対策アイテムの活用

帽子や吸湿速乾性の衣服の着用、空調服や送風機の活用



そのほか、日々の体調管理など熱中症に負けない体づくりをしておきましょう！

